

## 万田31号の使用方法（標準）

### 葉茎菜類 < アスパラガス 1年目 >

使用時期	使用濃度 (希釈倍率)	使用回数	使用方法	使用目的
播種後	10,000倍	1回	かん水	発芽促進
本葉が出てから	10,000倍	10日おき 定期使用	葉面散布	根張り促進、初期生育促進 環境ストレスの耐性向上
定植時	10,000倍	1回	かん水	活着促進
定植後～黄化前	10,000倍	10～15日おき 定期使用	葉面散布	生育促進 環境ストレスの耐性向上

### 葉茎菜類 < アスパラガス 2年目以降 >

使用時期	使用濃度 (希釈倍率)	使用回数	使用方法	使用目的
立茎後～黄化前	10,000倍	10～15日おき 定期使用	葉面散布	品質と収量の向上 環境ストレスの耐性向上

※1か月に1回、かん水の併用もおすすめ

(水量に関係なく、1回につき万田31号を30ml/10a使用してください)

- 散布量は、10a当り300ℓ（収穫前）を基準として設定していますが、散布量が多い場合は低濃度でもお使いいただけます。
- 300ℓ以上散布する場合には濃度にこだわる必要はなく、万田31号の1回の使用量は10a当り30mlを目安としてください。

★本使用法は、環境条件によっては、多少の変更が必要となります。

★万田31号は、特殊肥料ですが、必要とする肥培管理などは十分に徹底して下さい。

★台風などで草勢が弱っている時には、5,000倍液を1～3日置きに2～3回連続散布する方法があります。